



# sy phi lis



**la syphilis  
débarque  
à la réunion**

pour en savoir plus,  
contactez sida info service  
au 0 800 840 800\*

\*Gratuit à partir d'un poste fixe



**La syphilis est une infection sexuellement transmissible très contagieuse.** Elle se transmet beaucoup plus facilement que le VIH/sida.

**La contamination peut se faire lors de n'importe quel rapport sexuel sans préservatif, y compris lors d'une fellation** (aussi bien en suçant qu'en se faisant sucer). Une personne infectée et non traitée peut transmettre la syphilis plus d'un an après l'avoir attrapée, même si elle n'a pas de signe apparent.

**Vous pouvez avoir la syphilis et ne présenter aucun symptôme.** Lorsqu'ils existent les symptômes sont variables et parfois difficiles à identifier.

Les premiers signes surviennent 10 à 90 jours après la relation sexuelle à risque. L'un des premiers signes est une petite plaie creusée (chancre) qui apparaît à l'endroit où le microbe est entré (pénis, anus, vulve, col utérin, gorge...).

Cette plaie ressemble à un petit cratère qui mesure 1 à 15 mm de diamètre. Elle ne fait pas mal et peut passer inaperçue. Le plus souvent un gros ganglion est retrouvé à proximité. La plaie et le ganglion disparaissent en quelques semaines, même sans traitement. La disparition spontanée de la plaie ne signifie pas que la maladie a guéri toute seule. Elle continue à évoluer.

Si la petite plaie n'a pas été traitée, des taches peuvent apparaître sur la peau, sur la langue ou sur le gland. Après quelques semaines ou quelques mois ces taches disparaissent mais la maladie continue à se développer si un traitement adapté n'a pas été prescrit.

10 à 30 ans plus tard la syphilis peut provoquer des dommages graves et irréversibles au cerveau, au cœur, aux yeux...

Chez les personnes atteintes par le VIH/sida, les complications sont plus fréquentes et peuvent être beaucoup plus précoces (quelques années voire quelques mois).

**La syphilis est une maladie grave mais elle se traite facilement.** Quand elle est diagnostiquée tôt, une seule injection d'antibiotique suffit.

Le traitement ne met pas à l'abri d'une nouvelle contamination. Pour éviter de contracter de nouveau la syphilis, utilisez une capote pour chaque relation sexuelle, y compris lors des fellations.



# la syphilis à la réunion

Depuis quelques années, nous assistons à une **augmentation importante** du nombre de cas de syphilis à la Réunion.

Les personnes les plus concernées sont :

- Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
- Les personnes ayant des partenaires multiples.
- Les personnes ayant déjà eu une IST, en particulier le VIH/sida. À la Réunion, entre 2006 et 2008, les cas de syphilis ont été multipliés par 4 chez les personnes vivant avec le VIH.
- Les personnes ayant eu des relations sexuelles non protégées dans un pays où la syphilis est fréquente (Afrique, Madagascar, Asie...).

Si vous êtes concerné(e), faites un **test de dépistage**.  
Même si vous n'avez aucun symptôme.



# où faire un dépistage?

Vous pouvez demander à votre **médecin** de vous prescrire un test de dépistage de la syphilis et faire la prise de sang dans un laboratoire de biologie.

Vous pouvez faire un dépistage gratuit dans une Consultation de Dépistage et de Diagnostic des IST (CIDDIST) :

- **CIDDIST Nord** CHR (Bellepierre) – Allée des Topazes – Saint-Denis – Service d'immunologie – Tél : 0262 90 55 69

- **CIDDIST Ouest**  
4, rue des Salins – Saint-Paul – Tél : 0262 34 13 13

- **CIDDIST Sud** CHR (Terre Sainte) – Avenue du Président Mitterrand – BP 350 – 97448 – Saint-Pierre Cedex – Service maladies infectieuses – Tél : 0262 35 91 65

- **CIDDIST Est**  
Hôpital de Saint-Benoît – 2, rue Montfleury – Tél : 0262 50 85 05

**En cas de prises de risques répétées (y compris fellations non protégées), il est conseillé de faire un test tous les ans voire tous les six mois.**



association  
réunionnaise pour  
la prévention  
du sida

11 bis rue Saint-Jacques – 97400 Saint-Denis  
Tél : 02 62 21 88 77 – Fax : 02 62 94 12 60  
Site web : arps-info.com  
E-mail : prevention@arps-info.com

Avec le soutien du Conseil général de la Réunion  
et du GRSP Réunion